



### Ferinject (carboxymaltose ferrique) : extension d'indication

L'ANSM accorde un avis favorable au remboursement du FERINJECT 50 mg/ml, dispersion injectable pour perfusion, dans le traitement de la carence martiale, lorsque les préparations orales de fer ne sont pas efficaces ou qu'elles ne peuvent pas être utilisées ou qu'il existe un besoin clinique d'administrer du fer par voie IV rapidement.

[Pour en savoir plus](#)

### Baisse du prix relevé de l'amoxicilline

Après une hausse des prix pour sécuriser l'approvisionnement pendant l'hiver, le Journal Officiel du mardi 09 avril a publié un avis abaissant le prix de plus de 100 présentations d'amoxicilline ou d'amoxicilline / acide clavulanique, à compter du 1er mai.

L'avis concerne une centaine de références, dont les princeps Clamoxyl\* et Augmentin\* de GSK, ainsi que des génériques proposés par Almus, Arrow (groupe Aurobindo), Biogaran (groupe Servier), Cristers, KRKA, Sandoz, Teva, Zentiva et Zydus, sous différents dosages (de 125 mg à 1g) et différentes présentations (comprimés, gélules, poudre pour suspension buvable).

[Pour en savoir plus](#)

### Fin des tensions d'approvisionnement en Corgard 80 mg (nadolol)

L'ANSM vous informe que les difficultés d'approvisionnement du Corgard (nadolol) rencontrées depuis l'automne 2023 ont pris fin. Les boîtes de Corgard 80mg sont de nouveau disponibles sans restriction.

[Pour en savoir plus](#)

### Vigilance demandée lors de la prescription ou la délivrance des médicaments contenant du tramadol

L'ANSM annonce que de plus petits conditionnements de tramadol, en boîte de 10 ou de 15 comprimés ou gélules, sont progressivement mis à disposition sur le marché français.

En janvier 2023, l'ANSM ont demandé aux laboratoires commercialisant des médicaments à base de tramadol, princeps et génériques, de mettre à disposition des boîtes adaptées aux traitements de courte durée, tout en maintenant sur le marché le conditionnement de 30 comprimés pour les traitements de longue durée. L'objectif était de répondre à l'augmentation des signalements d'abus et de dépendance avec le tramadol, dans un contexte de mésusage ou d'usage détourné.

L'ANSM demande aux professionnels de santé de rester vigilants lors de la prescription ou la délivrance des médicaments contenant du tramadol. Ce dernier doit être délivré par les pharmaciens dans les plus petits conditionnements possibles, adaptés à la prescription.

[Pour en savoir plus](#)

### Produits de contraste : le point sur les flacons de produits de moins de 50 ml

À compter du 1er avril 2024, les flacons de produits iodés de moins de 50 ml restent pris en charge par l'Assurance Maladie lorsqu'ils sont dispensés par les pharmacies d'officine aux patients, à la différence des flacons de 50 ml et plus.

À compter du 1er avril 2024, les flacons de produits iodés de 50 ml et plus ne seront plus délivrés par le circuit officinal et doivent être achetés directement par les radiologues libéraux auprès des fournisseurs ou des officines (commandes à usage professionnel) et administrés aux patients au moment de leur examen.

**Pour en savoir plus**

**Actualisation des recommandations vaccinales contre les méningocoques A, C, W, Y et B**

**Tableau récapitulatif des recommandations de la HAS<sup>(1)</sup>**

Sérogroupe	Nourrissons	Adolescents et jeunes adultes (11-24 ans)	Autres populations
<b>ACWY</b>	<p>Vaccination tétravalente obligatoire selon un schéma vaccinal à 2 doses :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dose unique de primovaccination à 6 mois</li> <li>Dose de rappel à 12 mois</li> </ul> <p>en remplacement de la vaccination dirigée contre le sérogroupe C</p> <p>Vaccin : Nimenrix</p>	<p>Vaccination tétravalente recommandée selon un schéma à une dose administrée entre 11 et 14 ans, indépendamment du statut vaccinal</p> <p>Rattrapage vaccinal recommandé chez les 15 - 24 ans</p> <p>Vaccins : Nimenrix, Menquadfi et Menveo</p>	<p>Maintien des recommandations en vigueur concernant la vaccination tétravalente pour les populations particulières, les professionnels et autour d'un ou plusieurs cas d'infections invasives à méningocoques</p>
<b>B</b>	<p>Vaccination obligatoire chez les nourrissons (recommandée depuis 2021) selon le schéma :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1ère dose à 3 mois</li> <li>2ème dose à 5 mois</li> <li>Dose de rappel à 12 mois</li> </ul> <p>Vaccin : Bexsero</p>	<p>Ne pas élargir, à ce stade, à tous les adolescents la vaccination dirigée contre le sérogroupe B</p>	<p>Maintien de la stratégie en vigueur chez les personnes à risques et en situation d'hyperendémie</p> <p>Vaccins : Trumenba et Bexsero</p>

(1) [https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3502914/fr/infections-invasives-a-meningocoques-des-recommandations-vaccinales-actualisees](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3502914/fr/infections-invasives-a-meningocoques-des-recommandations-vaccinales-actualisees)