



Ixprim[®], Zaldiar[®]

Paracétamol + Tramadol
Comprimé, comprimé effervescent
37,5 mg/325 mg



Traitement de crise

Disponible en pharmacie de ville





Palier 1+2

Traitement de
crise

Ixprim[®], Zaldiar[®]

Paracétamol + Tramadol

Comprimé, comprimé effervescent

37,5 mg/325 mg

A quoi sert mon médicament ?

- Traitement symptomatique des douleurs modérées à intenses

Comment prendre mon médicament ?

- **1 à 2 comprimé(s)** par prise, toutes les **4 à 6 heures**
- Max 8 comprimés par jour
- Délai d'action : 30 à 60 min
- Durée d'action : 4 à 6 heures

Mon médicament peut-il interagir avec un autre médicament ?

- Certains antidépresseurs (demander conseil à votre pharmacien), linézolide (antibiotique).
- **Attention à ne pas dépasser 1000 mg de paracétamol par prise et attention aux spécialités qui contiennent du paracétamol en association / (cf carte paracétamol)**

Quels sont les effets indésirables possibles de mon médicament ?

- Nausées, vertiges, somnolence, constipation et hypersudation
- *Si mauvaise tolérance, une prise simultanée de 1 comprimé de 500 mg de paracétamol + 1 comprimé de tramadol/paracétamol est possible*



SOYEZ PRUDENT !
Ne pas conduire
sans avoir lu
la notice