



Topalgic[®], Contramal[®], Orozamudol[®]

Tramadol

*Gélule, comprimé, comprimé effervescent,
solution buvable 50 mg*

Libération Immédiate (LI) : effet thérapeutique rapide



Traitement de crise

Disponible en pharmacie de ville





Palier 2

Traitement de
crise

Topalgic®, Contramal®, Orozamudol®

Tramadol

*Gélule, comprimé, comprimé effervescent,
solution buvable 50 mg*

Libération Immédiate (LI) : effet thérapeutique rapide

A quoi sert mon médicament ?

- Traitement des douleurs modérées à sévères

Comment prendre mon médicament ?

- **400 mg max par jour de tramadol (formes LP + LI confondus)**, 50 à 100 mg par prise toutes les **4 à 6 heures**
- Délai d'action : 1 à 2 heures
- Durée d'action : 4 à 7 heures
- Peut être pris en même temps que le paracétamol

Mon médicament peut-il interagir avec un autre médicament ?

- Certains antidépresseurs (demander conseil à votre pharmacien), linézolide (antibiotique).

Quels sont les effets indésirables possibles de mon médicament ?

- Nausées, vertiges, somnolence, constipation et hypersudation



**Pas de prise simultanée de
Nefopam et de Tramadol !**