



Topalgic[®], Zamudol[®]

Tramadol

*Gélule, comprimé, comprimé effervescent,
solution buvable*

50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg

*Libération Prolongée (LP) : effet thérapeutique
prolongée sur une période de temps plus longue*



Traitement de crise

Disponible en pharmacie de ville





Palier 2

Topalgic[®], Zamudol[®]

Tramadol

Gélule, comprimé, comprimé effervescent,
solution buvable

50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg

Libération Prolongée (LP) : effet thérapeutique
prolongée sur une période de temps plus longue

Traitement de
crise

A quoi sert mon médicament ?

- Traitement des douleurs modérées à sévères

Comment prendre mon médicament ?

- **400 mg max par jour de tramadol (formes LP + LI confondus)**, 50 à 200 mg par prise toutes les 12 heures
- Délai d'action : 2 à 3 heures
- Durée d'action : 12 à 24 heures
- Peut être pris en même temps que le paracétamol

Mon médicament peut-il interagir avec un autre médicament ?

- Certains antidépresseurs (demander conseil à votre pharmacien), linézolide (antibiotique).

Existe-t-il des contre indications pour mon médicament ?

- Antécédent d'épilepsie

Quels sont les effets indésirables possibles de mon médicament ?

- Nausées, vertiges, somnolence, constipation et hypersudation



**Pas de prise simultanée de
Nefopam et de Tramadol !**



SOYEZ PRUDENT !
Ne pas conduire
sans l'avis d'un
professionnel de
santé