



Actiskenan[®], Skenan[®]

Morphine

*Comprimé ou gélule à libération immédiate
ou à libération prolongée*



Traitement de crise

Disponible en pharmacie de ville





Douleurs intenses ou rebelles

Traitement de crise

Actiskenan[®], Skenan[®]

Morphine

Libération Immédiate (LI) : effet thérapeutique rapide

Libération Prolongée (LP) : effet thérapeutique prolongé sur une période de temps plus longue

Comment prendre mon médicament ?

| Forme | LI | LP |
|----------------|---|---|
| Spécialités | Actiskenan [®] | Skenan [®] |
| Posologie | 1 prise toutes les 4 à 6h | 1 prise toutes les 12h |
| Délai d'action | 30 à 60 min | 2 à 4h |
| Durée d'action | 4h | 12h |
| Arrêt | Diminution progressive des doses après un traitement prolongé | Diminution progressive des doses après un traitement prolongé |

Existe-t-il des contre indications pour mon médicament ?

- Insuffisance respiratoire, insuffisance hépatique, allaitement

Quels sont les effets indésirables possibles de mon médicament ?

- Constipation, dépendance, réaction cutanée sévère ; difficultés respiratoires ou vertiges, nausées, somnolence.**



SOYEZ PRUDENT !
Ne pas conduire !
Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin.