



Morphine

Morphine
Voie injectable



Traitement de crise

Disponible uniquement en pharmacie

hospitalière





Douleurs intenses ou rebelles

Traitement de crise

Morphine

Voie injectable

**En hospitalisation, solution injectable dans la PCA
(Analgésie Contrôlée par le Patient)**

Comment prendre mon médicament ?

- Doses (bolus) de morphine avec une période réfractaire (sans réinjection) de 7 à 15 mn et une dose maximale sur 4h
- A l'aide d'une pompe (en appuyant sur un bouton poussoir)
- Par le patient lui-même, qui adapte sa demande à ses besoins
- Délai d'action : 15 min
- Durée d'action : 3 à 4h

Quels sont les effets indésirables possibles de mon médicament ?

- Constipation, nausées / vomissements, sécheresse buccale démangeaisons

Comment pouvons-nous anticiper la prise en charge des effets indésirables possibles ?

- Prescription anticipée d'un laxatif
- Prise d'un antiémétique
- Humidification de la bouche, consommation de petites quantités d'eau ou de glace, bain de bouche de bicarbonate
- Ajout de nalbuphine dans la PCA

Quelles sont les indications de surdosage de mon médicament ?

- *Somnolence, dépression respiratoire = SURDOSAGE*



SOYEZ PRUDENT !
Ne pas conduire !
Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin.