



# Ixprim<sup>®</sup>, Zaldiar<sup>®</sup>

**Paracétamol 325 mg + Tramadol 37,5 mg**  
**Comprimé, comprimé effervescent**



**Traitement de crise**

**Disponible en pharmacie de ville**





## Palier 1+2

**Ixprim<sup>®</sup>, Zaldiar<sup>®</sup>**

**Paracétamol 325 mg  
+ Tramadol 37,5 mg**

**Comprimé, comprimé effervescent**

Traitement de  
crise

### A quoi sert mon médicament ?

1 g = 1000 mg

- Traitement symptomatique des douleurs modérées à intenses

### Comment prendre mon médicament ?

- **1 à 2 comprimé(s)** par prise, toutes les **4 à 6 heures**
- Max 8 comprimés par jour
- Délai d'action : 30 à 60 min

### Quelles précautions prendre avec mon médicament ?

- Certains antidépresseurs (demander conseil à votre pharmacien), linézolide (antibiotique).
- **Attention à ne pas dépasser 1000 mg de paracétamol par prise et attention aux spécialités qui contiennent du paracétamol en association / (cf carte paracétamol)**
- Contre indiqué en cas d'antécédents d'épilepsie/convulsion sans avis du médecin.



Risque accru de convulsion si prise simultanée d'Acupan/ Nefopam et de Tramadol (uniquement sous avis médical).

### Quels sont les effets indésirables possibles de mon médicament ?

- Paracétamol : cf carte paracétamol
- Tramadol : nausées, vertiges, somnolence, constipation et hypersudation
- Possibilité de diminuer à :



1 comprimé de  
500 mg de  
paracétamol



1 comprimé de  
paracétamol /  
tramadol



**SOYEZ PRUDENT !**  
**Ne pas conduire**  
**sans avoir lu**  
**la notice**