



Actiskenan[®], Skenan[®]

Morphine

*Comprimé ou gélule à libération immédiate
ou à libération prolongée*



Traitement de crise

Disponible en pharmacie de ville





Douleurs intenses ou rebelles

Traitement de crise

Actiskenan[®], Skenan[®]

Morphine

Libération Immédiate (LI) : effet thérapeutique rapide

Libération Prolongée (LP) : effet thérapeutique prolongé sur une période de temps plus longue



A quoi sert mon médicament ?

- Traitement de la douleur intense ou rebelle.
- Pour les douleurs nécessitant des morphiniques, un avis médical est nécessaire.

Comment prendre mon médicament ?

Forme	LI	LP
Spécialités	Actiskenan [®]	Skenan [®]
Posologie	1 prise toutes les 4 à 6h	1 prise toutes les 12h
Délai d'action	30 à 60 min	2 à 4h

Quelles précautions prendre avec mon médicament ?

- Contre indiqué en cas d'insuffisance respiratoire, insuffisance hépatique, allaitement

Quels sont les effets indésirables possibles de mon médicament ?

- **Constipation, dépendance, réaction cutanée sévère ; difficultés respiratoires ou vertiges, nausées, somnolence.**



SOYEZ PRUDENT !
Ne pas conduire !
Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin.