



## Point médicaments n° 24



### **PYRUKYND® (mitapivat) autorisé dans l'Union européenne pour les adultes atteints de thalassémie**

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché pour PYRUKYND® (mitapivat), un activateur oral de la pyruvate kinase (PK), destiné au traitement de l'anémie chez les adultes atteints d'alpha- ou de bêta-thalassémie dépendante ou non des transfusions, et bénéficiant du statut de médicament orphelin.

[Pour en savoir plus](#)

### **Propranolol 40 mg : nouvelles tensions d'approvisionnement et recommandations de prise en charge**

Le propranolol 40 mg comprimé subit à nouveau de fortes tensions d'approvisionnement, après une amélioration en mars, avec un retour à la normale attendu vers mi-juillet 2026.

En attendant, il est recommandé de ne pas initier de nouveaux traitements quand c'est possible et de privilégier d'autres bêtabloquants selon l'indication et le patient.

Des lots de Propranolol Teva 40 mg seront remis à disposition de façon exceptionnelle en France d'ici mi-juin 2026 afin de limiter l'impact de la pénurie.

[Pour en savoir plus](#)

### **Tension d'approvisionnement en bosentan 125 mg : mesures de continuité des traitements**

Le laboratoire Viatris a notifié l'ANSM d'une tension temporaire d'approvisionnement concernant son médicament Bosentan Viatris 125 mg.

Dans ce cadre, des démarches ont été engagées auprès du laboratoire Viatris afin d'explorer des possibilités d'importation de bosentan 125 mg, permettant d'assurer la continuité des traitements. Par ailleurs, d'autres laboratoires ont été sollicités pour renforcer l'approvisionnement. Un premier lot du laboratoire Arrow est attendu en pharmacie à usage intérieur (PUI) début juin 2026.

Les niveaux de stock actuels devraient permettre de couvrir les besoins jusqu'à la fin du mois de juin 2026. De nouveaux approvisionnements sont ensuite prévus à partir de la mi-juillet 2026.

En cas d'indisponibilité du dosage 125 mg durant cette période, il est possible de substituer par des comprimés de bosentan 62,5 mg, sans nécessité de nouvelle prescription, à condition d'adapter la posologie : les patients habituellement traités par un comprimé de 125 mg devront prendre deux comprimés de 62,5 mg.

Les stocks disponibles en 62,5 mg permettent d'assurer la continuité des traitements pendant cette phase transitoire.

Cette mesure de substitution ne s'applique pas au dosage 32 mg, lequel doit être exclusivement réservé aux indications pédiatriques.

[Pour en savoir plus](#)

## Mise à jour des documents diffusés par l'ANSM dans le cadre de Mesures de Réduction des Risques

Les documents diffusés par l'ANSM dans le cadre de mesures de réduction des risques relatifs à :

- [Bekemv \(Eculizumab\)](#).

sont disponibles sur le site de l'ANSM.

### Anticoagulants : recommandations de prise en charge thérapeutique

Le Groupe d'Intérêt en Hémostase Péri-opératoire et la Société Française d'Anesthésie-Réanimation présentent leurs recommandations formalisées d'experts concernant la prise en charge des anticoagulants dans le cadre d'une procédure invasive programmée.

[Pour en savoir plus](#)

### Morphine : prévention des surdosages et sécurisation des pratiques

Dans son dernier flash d'information « événements indésirables », l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes met l'accent sur la prévention des surdosages liés à la morphine et sur le renforcement des bonnes pratiques visant à sécuriser la prise en charge de la douleur.

[Pour en savoir plus](#)

### Bon usage de la méthadone et prévention des risques associés

Afin de réduire le risque d'interactions médicamenteuses et d'effets indésirables liés à l'utilisation de la méthadone, le respect des recommandations de bon usage est indispensable. Il est notamment essentiel que chaque patient traité par méthadone, ainsi que son entourage, dispose en permanence d'un kit de naloxone prêt à l'emploi afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de surdosage.

[Pour en savoir plus](#)